

نام بیمار یا کد بیمار:

جدول معیار تشخیص بالینی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

چنانچه جمع امتیازات ۱۲ و یا بیشتر شود مورد بعنوان محتمل CCHF تلقی شده و تحت درمان قرار گیرد

بیشتر از یک هفته	کمتر از یک هفته	۱. سابقه تماس با عفونت به صورت :
♦ ۲*	♦ ۳	گزش کنه، یا له کردن کنه با دست بدون پوشش (بدون دستکش یا حفاظ)
♦ ۲**	♦ ۳*	یا تماس مستقیم با خون تازه یا سایر بافتهای دامها یا حیوانات بیمار
♦ ۲	♦ ۳	یا تماس مستقیم با خون، ترشحات یا مواد دفعی بیمار تایید شده یا محتمل CCHF (شامل ورود سوزن آلوده به بدن)
♦ ۱	♦ ۲	یا اقامت یا مسافرت در یک محیط روستایی که احتمال تماس با دامها یا کنه وجود داشته، اما بروز یک تماس خاص تصادفی را نمی توان مشخص نمود

۲- نشانه ها و علائم:

♦ ۱	شروع ناگهانی
♦ ۱	تب بیش از ۳۸ درجه سانتی گرادحد اقل برای یکبار
♦ ۱	سردرد شدید
♦ ۱	درد عضلانی
♦ ۱	حالت تهوع با یا بدون استفراغ
♦ ۳	تمایل به خونریزی: راش پتشی، اکیموز، خونریزی از بینی، استفراغ خونی، هماتوری، یا ملنا

۳- یافته های آزمایشگاهی (در پنج روز اول بیماری)

♦ ۱	لکو پنی کمتر از ۳۰۰۰ در میلی متر مکعب یا لکو سیتوز بیشتر از ۹۰۰۰ در میلی متر مکعب	
♦ ۱	پلاکت کمتر از ۱۵۰۰۰۰ در میلی متر مکعب	ترمبو سیتو پنی
♦ ۲	پلاکت کمتر از ۱۰۰۰۰۰ در میلی متر مکعب	
♦ ۱	یا کاهش ۵۰ در صد گلبولهای سفید یا پلاکتها در طی ۳ روز	
♦ ۱	PT غیر طبیعی	
♦ ۱	PTT غیر طبیعی	
افزایش ترانس آمینازها		
♦ ۱	اسپاراتات آمینو ترانس فراز (AST) بیشتر از ۱۰۰ واحد در لیتر	
♦ ۱	آلانین آمینو ترانس فراز (ALT) بیشتر از ۱۰۰ واحد در لیتر	

توضیح اینکه دور امتیاز مربوطه گرد (O) شود. ◉ ندارد = صفر

* سیاه زخم و تب دره ریفت را باید رد کرد.

** تب مالت، تب کیو و سیاه زخم را باید رد کرد.

جمع امتیازات:

مهر و امضاء پزشک معالج: